核准日期：20[illegible]

修订日期：20[illegible]

[illegible]曲普瑞林注射液说明书

[illegible]

分子量：1311.46（按 [illegible] 计）

辅料：氯化钠、冰醋酸与注射用水

[illegible]

定期进行生物 - 内分泌检查和超声检查。[illegible]

素。

【不良反应】

[illegible] 由于性激素 [illegible] 醋酸曲普瑞林注射液会 [illegible]

[illegible]

[illegible] 抗凝剂的患者需特别注意避免 [illegible] 注射部位血肿。

[illegible] 也不能排除发生卵巢过度刺激的危险。应密切注

生育治疗：阴道出[illegible]

孕妇和哺乳期妇女[illegible]

一般情况，使[illegible]

外源性促[illegible]激素的刺激会增加多胎怀孕和子宫外孕的危[illegible]

[illegible]素轻微降低，

从而减少乳汁的产生。

【儿童用药】

不适用于儿童。

【[illegible]】

无[illegible]量。

【药物过量】

未见药[illegible]过量的报道。

【临床药理学】

药代[illegible]

[illegible]H）释放活[illegible]

[illegible]（约

20 μg[illegible]，对[illegible]生育力或一[illegible]

[illegible]未见明显影响。尚未进[illegible]普瑞[illegible]雄性生殖力评估。

[illegible]普瑞曲普瑞林 10 和 100 μg/kg/天（按体表面积计算约为[illegible]日用剂量的 0.2、0.8 和 8 倍[illegible]），可见母体毒[illegible]

[illegible]收增加和高[illegible]

剂量时平[illegible]

[illegible]为 2、20 和 200 μg/kg/天（按[illegible]表面积[illegible]人日用剂量的 0.1、[illegible]