

## 注射用伏欣奇

## 拜耳医药有限公司

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用。本品为处方药，请凭处方在医疗机构或药师指导下使用。请仔细阅读说明书并在医师指导下使用。

### 【药品名称】

通用名称：注射用伏欣奇

商品名称：金蓓欣

英文名称：Firsekibart for Injection

汉语拼音：Zhushexong Fuxinqi Dankang

### 【成份】

本品为伏欣奇注射液，每瓶含伏欣奇（按

### 【性状】

本品为无色澄明液体

### 【适应症】

本品适用于对非甾体类抗炎药和秋水仙碱禁忌、不耐受或缺乏疗效的，  
以及不能耐受非甾体类抗炎药和秋水仙碱的痛风性关节炎急性发作。

### 【规格】

200 mg/瓶。

### 【用法用量】

本品需要在有治疗经验的医生指导下用药。

#### 推荐剂量和给药方法

推荐剂量为 200 mg，皮下注射。

#### 药品配制

于 24 小时内使用。或储存在 2~8℃ 温度，并于 2 小时内使用。

注射部位：上臂外侧、腹部、臀部、大腿、小腿或臀部。建议每次注射时选择不同的注射部位，以避免局部酸疼。应避免在皮肤有淤青或皮疹的区域注射，应避免注射入瘢痕组织，因为这可能会导致药物暴露量不足。

‘适当程序处置’含糊，注射器和针头。

庄士丁·L·开平

轻度肝功能不全的患者无需调整剂量。但是，关于此类患者的临床经验有限。

轻度肾功能不全的患者无需调整剂量。但是，关于此类患者的临床经验有限。

## 安全性特征总结

接受本品 200 mg 治疗的患者中，最常报告的药物不良反应为高甘油三酯血症、高胆红素血症、丙氨酸氨基转移酶升高和天门冬氨酸氨基转移酶升高（详见表 1）。



女性妊娠期间慎用或禁用本品（参见【孕妇及哺乳期妇女用药】以及【药理毒理】）。

## （注意事项）

### 感染

使用本品会抑制白介素-1 $\beta$ ，可能会增加感染或严重感染的发生风险。因此，一旦出现感染，应该严密监测其症状及体征。存在活动性感染、反复感染史或感染高风险因素的患者，应遵医嘱谨慎使用本品。

本品可能抑制细胞因子产生和抑制细胞因子介导的免疫反应，从而增加感染风险。

当本品在结核患者中的安全性数据有限时，应谨慎使用。

在开始治疗之前，建议根据临床实践对所有接受本品治疗的患者，进行活动性和潜伏性结核感染评估，必要时对患者进行适当的筛查（例如：PPD或胸部影像学检查）。

活动性结核感染患者慎用本品。潜伏性结核感染患者或有结核感染高危因素者，应在专业医生指导下使用本品。必要时开始抗结核治疗。

所有患者在使用本品后，须严密监测持续性咳嗽、体重减轻、低热等症状或体征。

### 疫苗接种

使用本品时避免同时接种活疫苗或

老年(≥65岁)和年轻患者之间未报告总体安全性或有效性差异,但老年患者数据有限。

## 【药物相互作用】

本品未开展正式的药物间相互作用的研究。

体外试验数据表明,在2.00~200 μg/mL浓度范围内,本品能够调控白介素-1β对人原代肝细胞的CYP1A2、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6和CYP3A4的抑制作用。这对治疗指数窄、需进行个体化剂量调整的CYP450底物可能有临床相关性,使用这类药物治疗的患者在开始本品治疗时,应对其药效和/或药物浓度进行治疗监测,并进行个体化剂量调整。

## 【药物过量】

临床试验中未报告过量的药物过量病例。若出现药物过量,建议监测患者是否有任何不良反应的症状和体征,并采取适当的对症治疗。

## 【临床药理】

### 作用机制

参见【药理毒理】相关内容。

注射本品后,本品吸收缓慢,中位达峰时间 $T_{max}$ 在141~166小时之间。在50~200 mg剂量范围内,本品的体内暴露量随着剂量的递增而增加,具有线性药代动力学趋势。

**分布** 本品分布呈现二室模型特征,在痛风性关节炎患者中平均表观分布容积在8.0~12.1 L之间。群体药代动力学分析显示本品表观分布容积约为8.4 L,

关节炎患者中平均清除率在9.228~11.501 mL/h之间。群体药代动力学分析显示本品平均清除率约为10.4 mL/h。

### 特殊人群

#### 肾功能不全

群体药代动力学分析未发现轻度肾功能不全对本品全身暴露有临床意义的影响。

#### 肾功能不全

群体药代动力学分析未发现轻度和中度肾功能不全对本品全身暴露有临床意义的影响。

#### 其他特殊人群

群体药代动力学分析未发现性别、年龄、体重、种族、肾功能不全、肝功能不全对本品全身暴露有临床意义的差异。无需根据上述因素调整剂量。

### 遗传药理学

尚无关于本品遗传药理学相关的临床研究数据。

本品无遗传药理学数据。

### 【临床试验】

在一项对非甾体类抗炎药和/或秋水仙碱治疗无效的急性痛风性关节炎患者，反复发生急性痛风发作的患者（过去12个月内至少发作2次）开展的随机、双盲、对照、阳性对照、多中心的III期临床研究中，通过比较给药后72小时视觉模拟疼痛评分（VAS）较基线的变化，证实了本品治疗痛风性关节炎的有效性。

该研究分为24周的双盲治疗期和24周的开放治疗期。在双盲治疗期间，共156例患者接受本品皮下注射，156例患者至少接受了一次1mL复方倍他米松注射液肌肉注射（其中1例患者给药后无任何疗效评价）。

患者既往急性痛风发作次数平均为2.62次，超过90%的患者有伴随疾病，包括高脂血症（43.1%）、高血压（43.1%）、脂肪肝变性（25.1%）、肾结石（18.0%）、高甘油三酯血症（17.9%）、糖尿病（16.7%）、痛风（15.7%）患者在入组时有稳定的病情。

该研究分为24周的双盲治疗期和24周的开放治疗期。在双盲治疗期间，共156例患者接受本品皮下注射，156例患者至少接受了一次1mL复方倍他米松注射液肌肉注射（其中1例患者给药后无任何疗效评价）。

患者既往急性痛风发作次数平均为2.62次，超过90%的患者有伴随疾病，包括高脂血症（43.1%）、高血压（43.1%）、脂肪肝变性（25.1%）、肾结石（18.0%）、高甘油三酯血症（17.9%）、糖尿病（16.7%）、痛风（15.7%）患者在入组时有稳定的病情。

该研究分为24周的双盲治疗期和24周的开放治疗期。在双盲治疗期间，共156例患者接受本品皮下注射，156例患者至少接受了一次1mL复方倍他米松注射液肌肉注射（其中1例患者给药后无任何疗效评价）。

患者既往急性痛风发作次数平均为2.62次，超过90%的患者有伴随疾病，包括高脂血症（43.1%）、高血压（43.1%）、脂肪肝变性（25.1%）、肾结石（18.0%）、高甘油三酯血症（17.9%）、糖尿病（16.7%）、痛风（15.7%）患者在入组时有稳定的病情。

该研究分为24周的双盲治疗期和24周的开放治疗期。在双盲治疗期间，共156例患者接受本品皮下注射，156例患者至少接受了一次1mL复方倍他米松注射液肌肉注射（其中1例患者给药后无任何疗效评价）。

表 2 给药后 72 小时靶关节的疼痛视觉模拟评分 (VAS) 较基线的变化<sup>[1]</sup>

| 给药后 72 小时疼痛 VAS 均值 (SD)               |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 变化 <sup>[1]</sup>                     | 给药后 72 小时疼痛 VAS 较基线的变化 <sup>[1]</sup> |
| 5.70                                  | 5.70                                  |
| 组间差值 (95% CI)                         |                                       |
| 给药后 72 小时疼痛 VAS 较基线的变化 <sup>[1]</sup> |                                       |
| 采用重复测量混合效应模型 (MMRM) 估计最小时米松注射液组。      |                                       |

人IL-1 $\beta$ ，阻断其与IL-1 $\beta$ 受体的相互作用，从而阻断IL-1 $\beta$ 诱导的炎性介质产生。

## 毒理研究

### 遗传毒性

遗传毒性试验。本品未进行遗传毒性试验。本品未进行

### 生殖毒性

#### 大鼠毒性

大鼠生育力与早期胚胎发育毒性试验中，雄鼠从交配前9周至交配结束，雌鼠从交配前14天至妊娠第7天，每周1次皮下注射本品20、60、200 mg/kg以AUC计，暴露量分别相当于人最大临床推荐剂量200 mg的1.63、3.90、8.96倍（雄性）和6.32、15.23、23.87倍（雌性），雌雄大鼠生育力和早期胚胎发育未见明显影响。

大鼠胚胎-胎仔发育毒性试验中，鼠于妊娠第6天至第13天每周1次皮下注射本品20、40、120 mg/kg（以AUC计，暴露量分别相当于人最大临床推荐剂量200 mg的1.63、3.90、8.96倍），120 mg/kg剂量下对母体动物具有肝脏毒性（可致死），对发育的NOAEL分别为40 mg/kg和120 mg/kg。

没有进行试验中，雌雄大鼠于妊娠第6天至第18天每周1次皮下注射本品20、40、120 mg/kg以AUC计，暴露量分别相当于人最大临床推荐剂量200 mg的1.63、3.90、8.96倍（雄性）和6.32、15.23、23.87倍（雌性），雌雄大鼠生育力和早期胚胎发育未见明显影响。

分率升高。对母体动物和胚胎-胎仔发育的NOAEL为40 mg/kg。大鼠围产期发育毒性试验中，大鼠于妊娠第6天至哺乳期第21天每周1次皮下注射本品20、40、80 mg/kg以AUC计，暴露量分别相当于人最大临床推荐剂量200 mg的1.63、3.90、7.42倍），80 mg/kg剂量下对母体动物具有肝脏毒性（可致死），F<sub>1</sub>代门齿萌出和空中翻正达标日龄延迟。对母体动物和F<sub>1</sub>代动物的NOAEL为40 mg/kg。

### 致癌性

本品未进行致癌性试验。

### 【贮藏】

于2~8℃避光保存和运输。

### 【包装】

直接接触药品的包装材料：中硼硅玻璃管制注射剂瓶、冷冻干燥用溴化丁基橡胶塞。

100瓶/盒，100瓶/1枚与在案证能保欣奇

### 【有效期】

18个月。

### 【批准文号】

### 【上市许可持有人】

名称：长春金赛药业有限责任公司

注册地址：长春高新开发区王河街72号

邮政编码：130012

电话：800-820-0469

手机：400-820-0469

### 【生产企业】

名称：长春金赛药业有限责任公司

注册地址：长春高新开发区王河街72号

电话：800-820-0469

手机：400-820-0469

网址：<http://www.jinsepharm.com>